

Hippeastrum - Amaryllis

Page:Amaryllistrips —

Aan het eind van de bewaring vertonen blad en bloemknop bij lichte aantasting talrijke rode stipjes. Bij zware aantasting zijn ze egaal lichtrood gekleurd. Deze karakteristieke symptomen vallen vooral op na het uitgroeien van de plant.



Page:Grote narcisvlieg —

Na de oogst blijkt dat de bolschijf abnormaal sterk is verkurkt en aan de rand een gaatje vertoont, dat soms pas na verwijdering van enig weefsel zichtbaar is. De bollen zijn vaak minder goed gegroeid en iets donkerder van kleur.



Page:Narcismijt —

In de bol verkleurt het weefsel rondom holten tussen de rokken oppervlakkig geelbruin en later donkerbruin (foto).



Page:Tomatenbronsvlekkenvirus - Amaryllis —

De bladeren vertonen gele tot witte vlekken, kringvlekken en lijnpatronen. De symptomen zijn meestal scherp begrensd, maar kunnen ook in elkaar overlopen.



Page:Vuur - Bladvlekkenziekte - Amaryllis —

Donkerrode verkleuring van de bolrokken aan de randen van (natuurlijke) scheuren in de rokken. Rode vlekken op het blad net boven de bol en rode strepen op de bloemsteel als deze uit de bol komt.



Page:Wortellesieaaltje - Amaryllis —

Pratylenchus spp. of het wortellesieaaltje kan onder andere in Amaryllis tot productieverlies leiden. Uit de literatuur en een praktijkinventarisatie is bekend dat het gaat om de wortellesieaaltjes Pratylenchus penetrans en P. scribneri

